

Principales caractéristiques des principales variétés traditionnelles de pruniers offertes à la vente par les pépiniéristes en Belgique.

<u>Variété et pays d'origine</u>		<u>Maturité</u>	<u>Groupe de floraison</u>	<u>Auto-pollinisation</u>	<u>Production</u>	<u>Sensibilités majeures</u>	<u>Qualité du fruit</u> <u>Table</u>	<u>Culinaire</u>	<u>Appréciation globale</u>
<u>A. Variétés traditionnelles</u>									
Early Laxton	UK	f7-d8	2-3	1/2	<i>r</i>	<i>pl</i>		c+	±
Early Rivers		f7-d8	2	1	<i>r</i>		+	c+	++
Reine-Claude d'Oullins	F	d8-m8	3	2	<i>r</i>		+	c+	+
Monsieur Hâtif	F	d8-m8	3	0	<i>v</i>	<i>ec, fr, gu</i>	+/++		+
Bleue de Belgique	B	d8-m8	3	0/1	<i>a</i>		+/++		+
Belle de Louvain	B	m8-f8	4	2	<i>a</i>	<i>go, mo, pl</i>	±	c++	-/±
Reine-Claude d'Althan	H	m8-f8	3	0	<i>a/r</i>	<i>ec, mo, t</i>	+/++		±/+
Queen Victoria	UK	f8-d9	2-3	2	<i>rr</i>	<i>pl</i>	±/+	c+	-/±
Reine-Claude Dorée = R-C Crottée	?	f8-d9	3	0	<i>vf</i>	<i>ec</i>	++		+
Mirabelle de Nancy	F	f8-d9	4	1	<i>r</i>	<i>t</i>	+	c++	+
Altesse Double	I	m9	4	1/2	<i>v</i>	<i>ca</i>	+	c+, t++	±
Altesse Simple	?	m9-f9	4	2	<i>a</i>	<i>ca</i>	+	c+, t++	+
Monarch	UK	f9-d10	2	2	<i>v</i>	<i>ma</i>	±/+		-
Reine-Claude de Bavay	B	f9-d10	2	2	<i>f</i>	<i>ma</i>	±/+		±
<u>B. Variétés anciennes "RGF" diffusées par le CRA-W de Gembloux</u>									
Belle de Thuin	B	m8-f8	1-2	0	<i>rr</i>	<i>mo, gu, fr</i>	+/++	c++, t++	++
Wignon	B	m9-f9	3	2	<i>v</i>		+	c++, t++	+
Prune de Prince	B	m9-d10	1-2	2	<i>rr</i>	<i>r</i>	++	c++	++
Sainte-Catherine	B	f9-m/f10	3-(4)	2	<i>rr</i>	<i>t</i>	+	c++, t++	+

Maturité : le tableau est divisé en trois sections séparant les variétés précoces, de moyenne saison et tardives; 7 à 10 = juillet à octobre; d = début; m = mi; f = fin. **Groupe de floraison** : 1 très précoce, 4 tardif. **Autopollinisation** : 0 autostérile, 1 partiellement autofertile, 2 autofertile, 0/1 autostérile ou partiellement autofertile, selon les sources. **Production** : *f* faible, *v* variable suivant la localité ou l'année, *a* alternante, *r* régulière, *rr* régulière et élevée. **Sensibilités majeures** : *ca* fruit attaqué par le carpocapse; *ec* fruit éclatant facilement à la pluie; *fr* épiderme fragile, se tachant à la pluie; *go* fruit contenant souvent de la gomme; *gu* fruit très attaqué par les guêpes; *ma* maturation incomplète par automne froid; *mo* fruits moniliés par temps humide; *pl* arbre sensible au plomb à *Stereum*; *t* sensibilité à la tavelure du prunier; *r* sensibilité à la rouille. **Pour les trois dernières colonnes** : ++ très bon, + bon, ± assez bon, - médiocre. **Qualité du fruit** : c pour compotes et confitures, t pour la tarte. **Sources** : observations originales et données bibliographiques (Anonyme, 1979 ; Baker, 1986 ; Belmans, 1986 ; Dufour, ca. 1938 ; Gauthier, 1978 ; Van Cauwenberghe, 1935 ; Van Cauwenberghe et de Keijzer, 1954).