



MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE -
C.R.A. – W
Département Lutte biologique et Ressources
phytogénétiques
Rue de Liroux, 4 - B-5030 GEMBLoux
(Belgique)



Espaces Naturels Régionaux- ENR
Centre Régional de Ressources Génétiques
Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet
59650 Villeneuve d'Ascq (France)



AIDE AU CHOIX DE VARIÉTÉS DE POIRES « CLASSIQUES » MISES DANS LE COMMERCE PAR LES PEPINIERISTES PROFESSIONNELS.

Période de consommation : période moyenne de consommation après conservation en bonne cave ; 01, 02, ... 12 = janvier, février, ... décembre ; d = début, m = mi, f = fin. **Groupe de floraison** : 1 = très précoce, ... 4 = moyenne saison ; ... 7 = très tardif. **Qualité du pollen** : détermine la valeur de la variété comme pollinisateur ; + = très bon pollinisateur, - = mauvais pollinisateur ; pour assurer la mise à fruit, il faut veiller à planter deux variétés différentes qui fleurissent en même temps (même groupe de floraison ou appartenant à une classe avant ou après celle de la variété à féconder) dont au moins une des deux possède un bon pollen. **Sensibilité de la variété à la tavelure sur fruits et feuilles sans traitement fongicide** : + = faible sensibilité, en moyenne, très peu à peu de tavelure, sans incidence pour la récolte, sans traitement fongicide ; ± = sensibilité moyenne, incidence qui devrait pouvoir être limitée par quelques traitements fongicides (2 à 3) ou variétés à planter contre un mur à l'abri des pluies ; - = très forte sensibilité : incultivable en plein vent sans de nombreux traitements fongicides (5 et plus) qui ne feraient que limiter les dégâts, à réserver en espalier contre un mur au sud ou sud-est. **Sensibilité de la variété à la tavelure sur bois** : la tavelure sur les branches provoque les préjudices les plus importants. Cela peut entraîner le dessèchement et la mort de nombreuses branches (légende, voir tavelure sur fruits et feuilles). **Adaptation à la basse tige (compatibilité avec le cognassier) et à la haute tige** : + = très bonne ; ± = faible sur cognassier ou semi-incompatible (idéal serait un intermédiaire de greffe) ; - = incompatible avec le cognassier. **Qualité** : ++ = excellent, +/++ = très bon, + = bon, ± = moyen, - = médiocre. **Bilan global** : appréciation générale de la variété pour la culture d'amateur sans traitement fongicide.

Marc LATEUR, juillet 2006.



| Variétés | Période de consommation | Groupe de floraison | Qualité du Pollen | Sensibilité | | Adaptation | | Qualité | | Bilan global |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|---------|---------|-----------------|
| | | | | Tavelure | Tavelure | Basse tige | Haute tige | Table | Cuisson | |
| | | | | fruits & feuilles | bois | (Cognassier) | | | | |
| Précoce de Trévoux | m08 | 2 | + | ± | ± | ± | | ++ | | ± |
| Clapp's Favourite | f08 | 6 | + | ±/ - | ±/ - | ±/ - | + | + | | ±/ - |
| Bon Chrétien Williams | f08-09 | 5 à 6 | + | ± | ± | ±/+ | | + | ++ | ±/+ |
| Ananas de Courtrai | f08-09 | 4 | + | + | + | + | | ±/+ | | + |
| Calebasse à la Reine | f08-09 | 4 à 5 | + | ± | + | + | + | + | ++ | + |
| Triomphe de Vienne | d09 | 4 | + | + | + | ± | | + | | ++ |
| Seigneur Esperen | m09-10 | 4 | + | ± ⁽¹⁾ | ± | + | | +/+++ | | ±/+ |
| Doyenné Boussoch; Double Philippe; Beurré de Mérode | m09-10 | 2 à 3 | - | ± | + | ± | + | + | ++ | + |
| Beurré Superfin | m09-10 | 4 à 5 | + | ± | ± | + | | ++ | | ±/+ |
| Conférence | m09-11 | 4 à 5 | + | ± ⁽¹⁾ | ± | + | ± | + | + | ± |
| Beurré Lebrun | f09-10 | 3 à 4 | + | + | + | + | | + | + | ++ |
| Beurré Chaboceau; Jefkespeer | f09-10 | 4 | + | + | + | - | + | + | ++ | + |
| Beurré Hardy | f09-10 | 4 à 5 | + | - | - | + | | +/+++ | | (±)/ - |
| Louise Bonne d'Avranches | f09 | 4 | + | ±/ - | ±/ - | + | | +/+++ | | ±/ - |
| Durondeau | f09-11 | 4 | + | - | - | + | | +/+++ | ++ | (±)/ - |
| Williams Duchess | f09-10 | 4 | - | ± | ± | + | + | ±/+ | ++ | ±/+ |
| Légipont | d10-11 | 3 à 4 | + | - | ±/ - | - | + | + | + | ±/ - |
| Général Leclerc | d10-12 | 3 | + | ±/+ | ±/+ | + | | + | + | ±/+ |
| Doyenne du Comice | d10-11 | 6 | + | - | - | + | | ++ | | (±)/ - |
| Saint Mathieu | d10-11 | 5 | - | + | + | ± | + | ± | ++ | ++ |
| Duchesse d'Angoulême | d10-11 | 3 | + | ±/ (-) | ±/ (-) | + | | +/+++ | | ± |
| Nec Plus Meuris; Beurré d'Anjou | d10-12 | 2 | + | + | + | + | + | +/+++ | + | ++ |
| Jeanne d'Arc | d10-12 | 4 à 5 | + | ±/ (-) | ±/ (-) | + | | + | + | ±/ (-) |
| Jules d'Airoles | d10-12 | 6 | ± | ±/ - | ±/+ | + | + | +/+++ | | ±/+ |
| Beurré de Naghin | m10-12 | 5 à 6 | + | ± | ± | + | | +/+++ | | ±/+ |
| Beurré d'Hardenpont | m10-01 | 3 | ± | ±/ - | ± | + | + | ++ | | ±/+ |
| Beurré Alexandre Lucas | m10-01 | 1 | - | ± | ± | ± | | + | + | ± |
| Joséphine de Malines | f10-01 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | +/+++ |
| Comtesse de Paris | m10-02 | 1 | + | ±/+ | + | + | + | +/± | + | ±/+ |
| Saint Rémy | m10-03 | 4 | - | ±/ - | ±/ - | + | ±/ - | - | ++ | ±/ - |